

Чужие вещи - угроза для кожи



Чесотка

Это заразное кожное заболевание, вызываемое микроскопическими клещами, которые «живут» в верхнем слое кожи - эпидермисе. Заражение чесоткой происходит в процессе длительных контактов с заболевшим, через рукопожатия, ношение его одежды, особенно нижнего белья, пользование одной постелью, не соблюдении правил личной гигиены.

Первым симптомом болезни является кожный зуд, усиливающийся в ночное время, когда клещ проявляет наибольшую жизненную активность. На коже больного появляются мелкие парные высыпания розового цвета и расчесы, вначале в местах излюбленной локализации (бедро, живот, межпальцевые складки кистей).



Микроспория

Следующая категория заразных болезней кожи связана с грибковой инфекцией. Одним из наиболее часто встречающихся заболеваний является микроспория, или, как ее называют в быту, «стригущий лишай». Чаще всего им страдают дети. Источниками заражения могут быть больные котята, кошки, щенки, реже - взрослые собаки. Особенность заболевания является сезонный характер - чаще микроспорией болеют с августа по октябрь.

Клиническая картина характеризуется появлением на коже круглых, красных пятен, правильной формы с поверхностным шелушением. Отшелушившиеся чешуйки заразны.



Вшивость (педикулез)

Это заразное паразитарное заболевание, вызываемое вшами. Различают три вида вшей: головную, платяную и лобковую. Заражение чаще всего происходит при тесном бытовом контакте или использовании вещей больного.

При укусе вшей возникает сильный зуд, что, в свою очередь, приводит к появлению множественных линейных расчесов, которые могут осложняться вторичной инфекцией. При лобковом педикулезе характерно наличие на местах укусов сыпи с красновато-синеватым оттенком.




Сифилис, гонорея, хламидиоз

На коже и слизистых может появляться сыпь, начинают выпадать волосы. Необходимо помнить, что заболевание может протекать в скрытой форме, без внешних проявлений.

Основной путь распространения этих заболеваний – половой. Тем не менее, не исключено заражение бытовым путём.

Бытовой путь передачи возможен:

- при общем пользовании с больным предметами личной гигиены, постельного белья
- при касании глаз руками, загрязненными выделениями больного
- при пользовании общими полотенцами, мочалками, губками



Сыпь при вторичном рецидивном сифилисе на коже лица.



Сыпь при вторичном рецидивном сифилисе на коже стопы.



Бугорковый сифилис в виде изъязвленных очагов на коже голени при третичном сифилисе.

Герпес

В семействе вируса герпеса, которые могут вызывать заболевание у человека, пять подвидов: вирус простого герпеса 1 и 2 типа, вирус опоясывающего лишая, цитомегаловирус.

Заражение может произойти бытовым путём:

- через слюну
- белье, полотенца
- общую посуду
- средства гигиены
- сидения унитазов
- бассейны, бани

